

# Faits

## SUR L'IgIV À L'INTENTION DES PATIENTS EXTERNES



### Qu'est-ce que l'IgIV?

L'immunoglobuline intraveineuse (IgIV) est un produit sanguin qui contient des anticorps concentrés. Elle est faite de plasma de donneurs de sang. Il existe diverses marques commerciales d'IgIV au Canada; elles sont toutes semblables.

### Pourquoi en ai-je besoin?

L'IgIV sert à remplacer des anticorps chez les patients qui en ont moins que la normale (p. ex. immunodéficience primaire). Ces anticorps aident à combattre les infections.

Elle peut aussi servir à traiter d'autres problèmes, entre autres lorsque le corps attaque ses propres tissus et organes (p. ex. maladie auto-immune).

Demandez au médecin de vous expliquer le traitement par IgIV que vous allez recevoir.

Vous aurez à signer un formulaire de consentement à une transfusion sanguine, puisque l'IgIV est faite à partir du plasma sanguin.

### Risques

L'IgIV est qualifiée de produit sanguin sûr qui risque peu de transmettre des maladies.

Les donneurs de sang subissent des épreuves rigoureuses avant de pouvoir donner du sang; pendant la fabrication de l'IgIV, le produit est aussi traité pour détruire les virus qui causent le SIDA, l'hépatite B et l'hépatite C.

### Comment est-elle administrée?

L'infirmière installe une ligne intraveineuse (IV).

L'IgIV est administrée par une veine du bras ou de la main. C'est un liquide clair, habituellement dans une bouteille de verre, qui est lentement perfusé en plusieurs heures.

L'infirmière vérifie vos signes vitaux (tension artérielle, température et pouls) avant et pendant la perfusion.

### Effets secondaires

Les effets secondaires de l'IgIV surviennent habituellement pendant la perfusion ou les 24 heures qui suivent; ils ont tendance à être bénins et de courte durée.

Les patients qui sont bien hydratés avant la perfusion semblent avoir moins d'effets secondaires.

De 5 à 10 % des patients ressentent des effets secondaires bénins liés à la vitesse de la perfusion; on peut souvent les atténuer en ralentissant la vitesse de perfusion et en donnant des médicaments comme de l'acétaminophène (p. ex. Tylenol®) ou un antihistaminique (p. ex. Benadryl®).

### Obtenez une aide médicale d'urgence immédiate si vous ressentez :

- Mal de tête intense; douleur aux yeux, grande somnolence
- Enflure du visage ou de la langue
- Difficulté à respirer, serrement de poitrine
- Changement de couleur de l'urine (rouge ou foncée)
- Douleur intense dans le dos, d'apparition récente
- Faiblesse ou grande fatigue

### Il est important que vous signaliez n'importe quel de ces symptômes au médecin ou à l'infirmière.

Si ces symptômes se manifestent après votre retour à la maison, votre dossier devra être mis à jour; veuillez donc aviser la clinique le plus vite possible de tout effet secondaire ressenti à la maison.

Veuillez communiquer avec :

## Administration d'IgIV hors de la province

Dans de rares circonstances, des patients peuvent devoir transporter hors de la province et souvent hors du pays de l'IgIV émise en Ontario. Les patients qui travaillent, étudient ou prennent des vacances ailleurs qu'en Ontario pendant un certain temps peuvent tous avoir besoin de ce service.

Si le patient ontarien est admissible aux avantages de son assurance-santé provinciale pendant ce déplacement, un hôpital ontarien peut lui fournir de l'IgIV pour cette période à la demande de son médecin traitement ou d'un professionnel de la santé.

Cette section de la trousse contient des directives et des modèles de documents pertinents pour les patients et les médecins qui se trouvent dans de telles situations.